

Niet-cariogeen tandweefselverlies binnen centra voor bijzondere tandheelkunde

inventarisatie omvang problematiek en behandelvoorstellen

A. Patiëntgegevens

- geboortedatum:
- initialen:
- centrum voor bijzondere tandheelkunde te:

B. Ernst tandweefselverlies volgens Dutch Tooth Wear Index* (Wetselaar et al, 2009)

- 0 = geen slijtage
- 1a = slijtage beperkt tot het glazuur van de knobbeltoppen of de incisale tips
- 1b = slijtage beperkt tot het glazuur met facetten evenwijdig aan de oorspronkelijke contour
- 1c = slijtage beperkt tot het glazuur met waarneembare afvlakking van de knobbels of de incisale tips
- 2 = slijtage tot in het dentine, tot 1/3 verlies van de oorspronkelijke klinische kroonhoogte
- 3a = slijtage tot in het dentine, van 1/3 tot 1/2 verlies van de oorspronkelijke klinische kroonhoogte
- 3b = slijtage tot in het dentine, van 1/2 tot 2/3 verlies van de oorspronkelijke klinische kroonhoogte
- 4 = slijtage tot in het dentine, meer dan 2/3 verlies van de oorspronkelijke klinische kroonhoogte

B. Behandelvoorstel*

- vervolgen, vooralsnog geen restauratief herstel
 - met protectiesplint zonder protectiesplint
- cuspidaatgeleiding aanbrengen met composiet
 - met protectiesplint zonder protectiesplint
- lokaal herstel met composiet middels Dahl platform
 - met protectiesplint zonder protectiesplint
- uitgebreid herstel met composiet zonder beetverhoging
 - met protectiesplint zonder protectiesplint
- gegeneraliseerd herstel met composiet met beetverhoging
 - met protectiesplint zonder protectiesplint
- anders, nl:.....

C. Plek van behandeling*

- retour eigen tandarts met advies behandeling in CBT

*aankruisen wat van toepassing is